Messieurs n.° 33.

quand je reçus l'honneur d'être correspondant de l'académie, je pris l'engagement tacite de vous faire part de tous les faits remarquables qui se rencontreroient dans ma pratique, c'est pour y satisfaire, que je demande à la compagnie la permission de lui lire cette observation

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

à la fin de l'été de 1779 on amena à l'hôtel dieu de meaux, étienne boulommois agé de 13 à 14 ans de la paroisse de Compan du même diocèse, qui, dans la moisson tomba du haut d'une mule de blé, non seulement il se fractura la cuisse gauche, dans sa p.tie moyenne Inf.re, l'extrémité superieure du fémur rompuë perça au dehors dans sa p.tie externe, de la longueur de trois pouces, à la région du fascia lata précisément dans cette bande. il fut près d'un mois sans avoir de secours éfficaces,

ARC 39 n° 148

on la mena en cet état, il ne fut pas possible de parvenir par des extensions graduées même en dilatant la plaie de la remettre au ton, elle resta au dehors, tout fut inutile, vû l'ancienneté et le raccour=
=cissement du membre; je posai la p.^ce en direction le plus que je pus afin de tenter la rétraction de cette grande pièce sortie, quoique déja fort alterée. ne pouvant réussir, j'ai pris le parti des exfoliatifs, que j'intro=
=duisis dans la cavité cylindrique paralelement interieurement et exterieurement à la partie osseuse sortie, rasé les mamelons charnus de la plaie, je fis donc un colier en dehors de charpie trempé dans le beur d'antimoine, afin d'obtenir la chute de ce corps entier, j'y parvins au bout de 15 jours; cet Enfant alors ne tarda pas à guérir, la cuisse fut beaucoup plus courte, cela alloit à trois pouces relativement à la pièce tombée, la saillie au dehors de cette pièce devoit former avec la portion inferieure fracturée un angle obtus, de maniere que l'os étant dirigé par la rectitude naturelle, cette extrémité inf.^re ayant fluée des (?) de concert avec le ton de l'extremité

Superieure alendroit delachute obtenue; ces deux extremités ont fait leur effet, et la nature vigilante surtout dans les jeunes sujets et sains peut opérer dans leurs accroissement des miracles. pour m'en rendre certain, ayant toujours été curieux de sçavoir ce qu'étoit devenu cet enfant, au mois de may dernier je passai dans la paroisse, je le demandai, il étoit aux champs, je ne pu le voir, mais ce garçon ayant sçu mon empressement est venu depuis a ma maison ou je l'ai visité; c'est un grand garçon bien fait agé de 19. ans, il devoit rester une claudication tres sensible a peine s'appercoit-elle en marchant, si ce n'est une légère feinte, cette extremité n'a pas un demi pouce de moins, que la droite; a l'endroit de la partie de l'os, il y a un vestige, ou stygmate au fascia-lata, qui rentre en dedans tres fort, et figure comme celle d'une ombilic a tous les hommes.

Mr. vallée ancien chirurgien des hôpitaux de Paris et actuellement mon adjoint, en fut alors un temoin attentif.

D'apres cette obs.^{ion} ne croit-il pas préférable dans les fractures de ce genre de scier ou limer

la partie saillante de l'os pour en faciliter la
réduction surtout dans les jeunes sujets, que de
fatiguer le blessé par des extentions forcées,
dont il est tres facile de calculer l'inconvenient.

Rochard
Ancien ch[irurgi]en major des troupes
du roy. Licencié en medecine
retiré a Meaux sa patrie
associé Regnicole de l'academie
Royale de ch[irur]gie de Paris
et echevin de ladite ville

Je crois avoir lue a l'academie cette obs[ervati]on
en cas que cela ne soit pas, je l'envoie